

Næstved, den 13.10.10

## INFORMATION OMKRING FJERNELSE AF POLYPPER.

### OPERATIONSDAG ER

2 dage før operationsdagen modtager I en SMS-besked med tidspunkt for operationen. Modtager I ikke denne SMS-besked, beder vi jer ringe dagen før operationen mellem kl. 9.00 og kl. 12.00 med henblik på endelig aftale af mødetidspunkt.

### SYGDOMMEN - ÅRSAGER HERTIL.

Børnepolypper (adenoide vegetationer) består af hævet lymfevæv i næsesvælget. Foruden væske i ørerne som giver nedsat hørelse, vil der ofte være andre symptomer - så som "snork, snot og snøvl". Ved symptomer på børnepolypper, er behandlingen fjernelse af det hævede lymfevæv i næsesvælget.

### HELBEDØVELSE

Det vil være en fordel at give Pamol stikpiller hjemmefra før operationen, så det virker, når barnet skal opereres. Se dosis længere nede.

Før bedøvelsen skal patienten være FASTENDE i 6 timer. Det vil sige barnet må intet få at spise fra 6 timer før bedøvelsen. Indtil 2 timer før bedøvelsen må barnet få vand og tynd saft at drikke, ikke andet. De sidste 2 timer før bedøvelsen må barnet hverken spise eller drikke.

Operationen foregår i helbedøvelse - og varer ca. 20 minutter. Under hele forløbet vil barnet blive overvåget af anæstesilægen.

### OPERATIONEN

Fjernelse af polypper (adenoide vegetationer), der er beliggende i næsesvælget, fjernes gennem munden.

### EFTER BEDØVELSEN - OPVÅGNINGEN

Når operationen er afsluttet, og barnet er vågnet, vil barnet bliver overvåget indtil udskrivning er forsvarlig. Enkelte børn vil efter bedøvelsen kunne få kvalme og opkastning.

### SMERTEBEHANDLING.

Mod smerter anbefales Pamol.

Dosis børn: For børns vedkommende giver man Pamol som mikstur eller stikpiller. For Pamol stikpiller er maksimal dosis: 100 mg/kg/døgn. Dvs. et barn der vejer 20 kg må få 500 mg 4 gange i døgnet = 2000 mg.

For Pamol mikstur er maksimal dosis: 50 mg/kg pr. døgn. Dvs. et barn der vejer 20 kg må få 250 mg 4 gange i døgnet = 1000 mg. Svarer til 10 ml mikstur af gangen.

Ud over medicinen anbefaler vi is - køligheden virker i sig selv smertestillende.

#### KOMPLIKATIONER TIL OPERATIONEN

Komplikationer er sjældne, det vil typisk dreje sig om blødning.

#### ALMINDELIGT BESVÆR - HJEMME

I meget sjældne tilfælde kan der komme kraftigere blødning og så er det nødvendigt at kontakte os eller skadestuen, hvis det er efter kl. 15.00.

#### KOST

Kosten skal være blød og afkølet de første døgn.

Spis gerne is.

#### KONTROL

Der er ingen fast kontrol efter fjernelse af polypper.

#### NARKOSELÆGE

Annette Freudendal-Pedersen

[www.ballerupsmerteklinik.dk](http://www.ballerupsmerteklinik.dk)

Venlig hilsen

Henrik Møller

øre - næse og halslæge